~~n°. 48.~~ n°. XI.

Observations de Chirurgie concernant laguerison d'une carie de machoire, ~~Et le traitement de plusieurs separations du col du femur d'avec son Epyphise~~.

Par Mr. de Villiers Chirurgien Juré aparis.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Si la Carie des dents est Capable de communiquer Cette maladie aux alveoles et aux machoires qui les Contiennent, les Vlceres chancreux des gensives trop long temps negliges, sont Egallement suivis de pareilles effets, Comme on le va voir par l'observation suivantes.

Au mois de juillet 1741. un Enfan agé de six ans, eut à la suitte d'une petite verolle, un vlcere Chancreux qui luy détruisit toute la face externe de la gensive inferieure, depuis une canine jusqu'a l'autre, dont le progrès se continuoit, a la face interne de la même levre dans la meme Etendue qu'a la gensive. quant a la face interne de cette gensive, Elle n'estoit point ulcerée, mais neamoins sans adherance aux alveoles, dans la même Etendue que par devant. il est aizé de concevoir que les alvéoles estoient a decouvert, dans toute l'etendue de Cette Destructions de gensives.

Je dit au pere et a la mere, qu'il failloit que toute Cette portion de machoire et les dents, tombassent, que je n'avancerois pas si cela ce borneroit, au dessus ou au dessous des secondes dents, et qu'au fain il failloit

ARC 41 n°57

arrester le progrès du mal sans quoy il iroit encore plus loin. ils me demandèrent quelques jours pardans lesquelles ils prirent sans doutte de conseille, ensuitte, ils m'en abandonnerent le traitement le 28. octobre.

Je le traitay de la façon suivante.

ayant trouvé les quatres incisives tombées, je ne fust obligé de luy tirer que les deux canines qui vinrent sans peignes. Je touchay et lavé d'abord le tout avec le miel égiptiac, dans la veüe de deterger et d'arrester le progrès de l'ulcere. J'glissé ensuitte un bourdonet de quelques filets de charpis trempes dans le beaume de fioraventy entre la gencive et l'os, face interne; par dessus celuy cy un autre un peu plus gros, trempés dans la tinture de noix de galle extraite dans l'eau de milisse spiritueuse. Par devant, je me contanté d'un petit linge trempé dans le meme beaume, pour couvrir la face externe de l'os et l'interne de la ~~gencive~~ leüre. j'assujety ce linge et la leüre, avec une mentonniere assé large pour être ajustée a cette effet.

Ces pansements ont Etes continués dans le même ordre deux fois le jour, jusqu'au dissept octobre jour auquel l'exfoliation c'est faitte, de la portion de l'os, que j'ay dit être dépourveüe de gencive.

Cette portion de machoire, a 14. a 15. lignes de longeur sur onze de large et toute son Epaisseur. Elle contien depplus six alvéoles entieres et deux amoitiées; plus six des noyaux des secondes dents qui devoient poussier prieramment les premieres.. aprest Cette exfoliation, jay garny légerement le vide de quelques petits boudonnoirt tremppes dans le même beaume; quelques jours aprest plusieurs petites lames ont été Chassée aumoyens dequoy lulcere est devenu simple, mais Cependant Comme la premier molaire de Chaque costé, ne se trouvan plus soutteniié attandu la perte de la moitié de leur alveoles, quelque envie que jay eüe de les conserver jay été obligé de les tirer, parcequelles mentretenoient un gonflement qui sopposoit a mon pitention.

aprest lextraction de ses dernieres dents lulcere Etan devenu encore plus simple, il Cest trouvé totallement Cicatrisé et guerie le six xbre de la même année.

a chaque pansements, jetais obligé de methre sous la langue, un tampon de Charpis, pour absorber la salive.

Il ne reste a Cette enfan nul jncomoditet que Celles davoir huit dent de moins dans la bouche, dont je compte que deux luy reviendroy, cette portion de machoire nen ayant entrainé que six des secondes.

Il ne luy reste point de gensive pardevan, la nature a supplée a ce défaut, par une Cicatrice ferme qui ne passe pas le niveau des ramules.

premiere observation au Suiet du décolement de lepiphise du Col du femur.

Au commancement davril 1741. un Enfant agé de Six ans, tomba plusieurs marches dun Escalie. Lorsque on luy relevé, on Sapercut quil ne pouvait Se Soutenir sur la Cuisse et la jambe gauche. La mère le fit voir dans le meme moment a un Chirurgien qui ny ayant rien trouvé de luxé ny de Cassé dit quil ny avoit quune foulure En consequanse Se contenta dordonner des fomentation avec Leau devie et le repos, Ce qui ayant été Executé Lespasse de quinze jours Sans Succés on le fit voir a d'autres chirurgien et bailleurs Lesquelles ny ayant rien trouvé non plus, ordonnerent a peu pres Comme le premier.. Cinq mois Ce sont Ecoulés pandant les quelles larticulation de cette Cuisse et toute Ses parties Supérieures, est devenüe dun volume Si considérable, quelle avoit deux pieds trois pouches de tour.. Sur la fain daoust, la mere ayant apris que jettais revenu a paris, Elle maporta Son enfant Je trouvé que la tumeur formoit a la circonférance de larticle, un bourlet mol, pateux, Sans douleur et Sans inflamation, Ce qui me fit augurer que la matiere qui le formoit estoit limphatique et encore Contenüe dans la capsule Sinoviale, Puisque malgré le volume de la tumeur elle de bornoit autour de larticle. adjouté, que la cuisse et la jambe malade estoient plus courte que la Saine, de quatre travers de doigts. que cette